

# コロナワクチンの比較

2022/7/6

ワクチン種別		ファイザー	モデルナ	ノババックス	アストラゼネカ	小児用ファイザー	
		コミナティ筋注	スパイクバックス筋注	ヌバキソビット筋注	バキスゼブリア筋注	コミナティ筋注(5-11歳用)	
初回接種	接種対象者	12歳以上	12歳以上	18歳以上	40歳以上 (特に必要がある場合は18歳以上)	5歳以上12歳未満	
	接種用量	0.3mlを2回	0.5mlを2回	0.5mlを2回	0.5mlを2回	0.2mlを2回	
	1回目と2回目接種の間隔(標準)	3週間	4週間	①ノババックス→3週間 ①ノババックス以外→4週間	8週間	3週間	
	交互接種	10代20代男性で1回目モデルナを接種した場合、2回目にファイザーが可能  1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたこと等により、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難と判断した場合 国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居等により、1回目と2回目で同一のワクチンを接種することが困難な場合				不可	
追加接種	3回目	接種対象者	12歳以上	18歳以上	不可	不可	
		接種用量	0.3ml	0.25ml			0.5ml
		2回目からの接種間隔	5ヶ月	5ヶ月			6ヶ月
	交互接種	初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず接種可能					
	4回目	接種対象者	(1)60歳以上の方 (2)18歳以上で基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師が認める方		不可	不可	
		接種用量	0.3ml	0.25ml			
		3回目接種からの接種間隔	5ヶ月	5ヶ月			
		交互接種	1～3回目に接種したワクチンの種類に関わらず接種可能				
保管・保存	保管温度	-90～-60℃(凍結)	-20±5℃(凍結)	2℃～8℃(凍結を避ける)	2℃～8℃(凍結を避ける)	2℃～8℃(凍結を避ける)	
	保存方法・期間	有効期限：12ヶ月 使用前であれば、解凍後遮光して2℃～8℃で最長1ヶ月(31日間)保存可能 再凍結禁止	有効期限：9ヶ月 使用前であれば、解凍後遮光して2℃～8℃で最長30日間、8～25℃で最長24時間保存可能 再凍結禁止	有効期限：9ヶ月 外箱開封後、遮光して2～8℃	有効期限：6ヶ月 外箱開封後、遮光して2～8℃	有効期限：12ヶ月 使用前であれば、解凍後遮光して2℃～8℃で10週間保存可能 再凍結禁止	